

CHISLETT SUMMER NAVEL


<http://www.ivia.cva.es/variedades/>

Mutación de Washington originada en Australia. Árbol vigoroso, con alguna espina en las ramas de mayor vigor. Las flores carecen de polen y al igual que el resto de variedades del grupo navel, los frutos presentan ombligo.


Fruto de buen tamaño y gran calidad, es menos acida que Powell, si bien es menos productiva que Lane Late o Barnfield. El fruto mantiene en madurez una buena consistencia y mejora algo la adherencia del pedúnculo al fruto si la comparamos con Lane Late, lo que permite una recolección mas tardía, aunque para ello necesitara tratamiento para el amarre del fruto. Poco sensible a clareta. Tiene la corteza mas lisa que otras naranjas tardías y en zonas ventosas el fruto puede presentar rameado.



Instituto valenciano de investigaciones agrarias



EVOLUCION DE LA MADUREZ DEL FRUTO



Características fruto	
Peso g	220 - 250
Diámetro mm	78 - 83
Forma	Redonda Diámetro / Altura = 1,05
Corteza mm	3,5 - 4,0
Color	Naranja índice color = 12
% zumo	55 - 58
Semillas	No
Fructificación	Alta
Recolección	1 febrero - 15 mayo