



GANADERIA

La oveja guirra: una raza autóctona única

Socorro López Rodríguez

OFICINA COMARCAL AGRARIA
DE LA VALL D'ALBAIDA

La raza ovina valenciana denominada GUIRRA o SUDAT, forma un grupo de ovejas único propias de la Comunidad Valenciana que en la actualidad se encuentra en regresión y al borde de la extinción.

Es una raza local, que tiene una importancia significativa en las zonas difíciles del interior donde es una oveja apreciada debido a su rusticidad y adaptación al medio permaneciendo ignorada fuera de las zonas de cría habitual.

ORIGEN

Tiene una independencia étnica y lo más característico es el color de su piel y su lana de una coloración que va desde el rojo oscuro al alazán con diferentes degradaciones.

Se le atribuye una ascendencia africana cuyo ancestro directo sería la raza BENI AHSEN, de la costa atlántica de Marruecos, coincidiendo ambos en su color y en las particularidades de su lana.

CENSO Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En la actualidad está en regresión, habiéndose reducido paulatinamente los rebaños de raza pura, permaneciendo los mestizajes con la raza Manchega y Segureña principalmente. El censo de animales existentes en la Comunidad Valenciana, realizado recientemente, da un total de poco más de 3.000 cabezas, distribuidas como se puede observar en los cuadros.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS:

Perfil front-nasal ultraconvexo, proporciones longilíneas.

CABEZA

Perfil acarnerado, ultraconvexo en machos, sin cuernos en ambos sexos. Orejas horizontales.

La oveja Guirra se encuentra al borde de su desaparición.


CUELLO

Largo y cilíndrico, borde traqueal desnudo, provisto de mamellas en cierto número de animales.

TRONCO

Línea dorso-lumbar recta o ligeramente ensillada, cola semilarga, suele conservarla. Mama desarrollada de tipo globoso y bien implantadas.

Cabeza y aspecto de oveja hembra.



CENSO Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Población	Nº Ganaderos	Hembras (H)	Machos (M)	Reposición	
				M	H
V A L E N C I A					
Beniganim	2	530	22	4	60
Guadasequies	1	60	4	2	12
Alfarrasi	2	44	2		10
Pobla del Duc	1	380	13	6	80
Ollería	1	10	1		15
Quatretonda	1	180	2	1	17
Barig	1	60	3	1	7
Benifayó	1	70	1		6
Tuéjar	1	17	4	1	11
Pobla Vallbona	1	260	9	3	38
Benissanó	1	320	3	2	30
Casinos	1	113	7		29
Gandía	1	50	1		
Sueca	1	6	1		
Picassent	1	30	4		
Albalat Ribera	1	120	5		
Náquera	1	5	1		
TOTAL	19	2311	83	20	315
A L I C A N T E					
Altea	1	120	4	1	15
Benissa	1	23	1	1	4
Pego	3	222	13	2	60
Jalón	1	15	1		5
Calpe	1	60	3	1	4
Vergel	1	30	2	1	7
TOTAL	8	470	24	6	95
C A S T E L L Ó N					
Nules	1				30
Vall d'Uxó	1	20	1	*	
Almazora	1	200	6	*	
Onda	1	125	1	*	
Villareal	1	20	2	1	9
Puebla Tornesa	1	45	2	*	
Vinaroz	1	3	1		
Morella	1	56	1	1	10
TOTAL	8	469	14	2	49

(*) Mezcladas en rebaños mixtos.

TOTAL DE ANIMALES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Nº Ganaderos	Hembras (H)	Machos	Rep. (machos/hembras)
35	3.250	121	28/459

MIEMBROS Y APLOMOS

Fuertes, secos, finos y largos, pezuñas pigmentadas y bien aplomados.

PIEL

Pigmentada en rojo (arrugas faciales transversales en carneros).

MUCOSAS

Pigmentadas, trufa negra.

COLOR

Rojo oscuro, alazán tostado, pudiendo presentarse degradaciones pigmentadas. La tonalidad roja afecta a cabeza y extremidades y con la edad hay cierto encanecimiento manifiesto en la cabeza principalmente, que le da un aspecto característico.

Los corderos nacen fuertemente pigmentados tanto del vellón como de las zonas deslanadas perdiendo progresivamente con la edad la intensidad cromática.

Esta raza destaca por su aspecto rectilíneo, color rojizo de la piel y miembros aplomados.

VELLÓN

Cubre el tronco, cuello y los miembros hasta el codo. Deja libre la cabeza, borde inferior del cuello, vientre y regiones inferiores de las extremidades.

En el ganado adulto se presenta un color crema sucio. El vellón pesa de 4 a 5 kilos en machos y de 2 a 3 kilos en hembras, proporciona lana comercial tipo IV con rendimiento

del 30% al lavado; hoy en día carece de valor comercial.

FORMATO

La raza presenta un desarrollo corporal consecuente a las posibilidades nutritivas, no obstante, los pesos medios están: para machos entre 65 y 90 kilos y para hembras entre 55 y 75 kilos, en conjunto tienen una apariencia de animales largos y estrechos, un tanto desnudos y dóciles.

ECOTIPOS

Los ganaderos locales diferencian dos tipos: GUIRRA FINA originarios del interior (animales pequeños, rústicos, sobrios y resistentes al calor, fáciles para los desplazamientos) son los más apreciados por su rusticidad. GUIRRA BASTA, son animales de mayor formato debido a las mejoras en el manejo y la alimentación de las zonas costeras dando una mejor respuesta productiva.

CUALIDADES PRINCIPALES Y APTITUDES

RUSTICIDAD

Es una cualidad que le permite vivir en un medio donde la vegetación es pobre, basado en plantas de baja digestibilidad y de escaso poder alimenticio, resiste largas caminatas y el calor.

Es un animal longevo puede vivir hasta 13 ó 14 años, siendo frecuente las de 10 años.

Si se le administra una correcta

Pueden encontrarse dos tipos de guirra: fina y basta.

AREA GEOGRÁFICA DE LA RAZA GUIRRA



alimentación consigue unos índices de producción elevados.

REPRODUCCIÓN

El destete suele realizarse a los dos meses de edad. La primera cubrición se realiza a los nueve meses de edad. La primera gestación suele ser entre los 10 y 12 meses de edad.

Es un animal que puede vivir 13 ó 14 años.

Tiene un ciclo ovárico continuado, por lo que los partos se suceden a lo largo de todo el año, los semetales están de forma permanente con las ovejas por lo que no existe un plan reproductivo. Posee buen instinto maternal.

Es bastante prolífica, con 1,8 partos/año, con el 3% triples y 35% dobles.

PROLIFICIDAD

Es buena superando el 130% en rebaños con un buen manejo. El intervalo entre partos es de 6 ó 7 meses, apareciendo el celo entre 1 y 2 meses después del parto.

El porcentaje de partos: **triples** el 3% del rebaño, **dobles** el 35% del rebaño, siendo la media de número de partos por año de 1,8.

PRODUCCIÓN DE CARNE

Tiene muy buena aptitud para la producción de carne.

El cordero se alimenta en el aprisco y se sacrifica entre los 24 y 26 kilos, siendo la edad del sacrificio a los 3 meses. El rendimiento de la canal es próximo al 50%.

PRODUCCIÓN DE LECHE

Tiene muy buena aptitud lechera. En la actualidad se ordeñan menos, después de la venta de los corderos.

Los rendimientos son buenos. De los controles realizados sobre esta raza, comparativamente con un rebaño de raza manchega se llega a la

Aspecto de los corderos.



conclusión de que los rendimientos son semejantes, destacando como mas interesante que la oveja **guirra** tiene un periodo de lactación mas largo.

La duración de la lactación es de 3 meses, realizándose 2 ordeños diarios. Controlada la producción en una población de 60 hembras en ordeño la media es de 0,9 litros oveja/día.

PRODUCCIÓN DE LANA

El vellón tiene unas características especiales, el color, baja densidad y alta cantidad de Suarda, con bajos rendimientos al lavado, tiene buena finura la fibra lanosa. En resumen la lana es buena pero tiene muchos desperdicios y hoy en día no se estima su producción ya que se cotiza a bajo precio.

Tiene buena aptitud cárnica y lechera, con un óptimo índice de crecimiento.

ALIMENTACIÓN Y TIPO DE EXPLOTACIÓN

Son animales en pastoreo permanente, viven en pequeños hatos, salen diariamente al pastoreo aprovechando los subproductos de la huerta

Perfil de cordero.



Rebaño de corderos.

y los pastos de las zonas áridas del interior. El volumen del rebaño está limitado por el gran fraccionamiento de la tierra teniendo que respetar la propiedad privada, por lo que los ganaderos son propietarios sin base territorial, en independencia con las explotaciones agrícolas a las que arriendan pastos, rastros y subproductos de la agricultura.

Los recursos alimenticios principales son:

- La zona de la costa aprovecha la zona vegetal salitrosa del litoral y garriga mediterránea.
- En las zonas pobres del interior y de secano aprovechan los subproductos agrícolas como hojas de vid, almendro, cítricos, algarrobo, frutos del algarrobo y palmeras, subproductos industriales derivados de las frutas

Hembra con cordero.



y hortalizas, pulpa de cítricos, etc...

Se les suministra raciones complementarias cuyo componente principal es la alfalfa y la paja.

ALOJAMIENTOS

Son corrales y cobertizos semiabiertos, pues el clima benigno no demanda nada más.

SITUACIÓN ACTUAL

En pocos años se ha reducido el censo de forma alarmante, desapareciendo paulatinamente los rebaños de raza pura como consecuencia de los mestizajes con otras razas.

En la actualidad se han podido censar unos 3.000 ejemplares de hembras adultas de raza pura frente a las 4.000 censadas en el **catálogo de razas autóctonas** publicado en el año 1980.

Se encuentra en peligro de extinción por lo que está incluida en el grupo de "Razas de protección especial" en la Orden del Ministerio de Agricultura de 30/06/79 por la que se establece el catálogo de razas de ganado de España.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA RAZA

Desde el año 90 la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene establecidas medidas de apoyo y protección de la raza ovina ROJA o GUIRRA, mediante ayudas que consistían en 4.000 pts. por cordera de reposición y 15.000 por macho, con la condición de mantenerlos en la explotación durante 5 años.

Con el tiempo se ha comprobado que estas medidas son insuficientes, ya que si bien el censo se ha mantenido, no ha aumentado el número de ejemplares e incluso ha tendido a disminuir, ya que la edad de muchos de los criadores es bastante avanzada y muchos se han jubilado, vendiendo los animales que han sido absorbidos en rebaños de otras razas.

Por todas estas razones ha surgido la necesidad de crear la **Asociación de Criadores de Guirras de la Comunidad Valenciana** que recientemente se ha constituido con la denominación de: A.N. GUIRRA. La finalidad de dicha asociación es la conservación y mejora de los ejemplares puros de raza guirra.

Los técnicos veterinarios de la Conselleria de Agricultura de las comarcas de mayor incidencia de guirras y los ganaderos de la Asociación, están elaborando un plan de trabajo y seguimiento de los ejemplares existentes en la actualidad encaminado al mantenimiento y recuperación de la raza, que más tarde pretende materializarse en el **Libro genealógico de la raza Guirra**.

La Conselleria de Agricultura ha elaborado un plan de conservación para evitar su extinción.

Los índices de crecimiento son buenos y corresponden a una raza de producción cárnica

Al nacer	3 - 4 kilos
A los 30 días	9 - 10 kilos
A los 60 días	15 - 17 kilos
Al sacrificio	24 - 26 kilos



Detalle de la parte posterior.



Rebaño en pastoreo.



Cabeza y aspecto del macho.



Canales preparados.



la **Guirra** es una **Oveja** del siglo **XXI**

RAZA OVINA ROJA
GUIRRA O SUDAT
OVEJA AUTOCTONA
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA



ASSOCIACIÓ
NACIONAL DE
CRIADORS DE
RAÇA GUIRRA

A.N. GUIRRA

CARRER AURORA, 87 . 46830
BENIGNANIM . VALENCIA



GENERALITAT
VALENCIANA
CONSELLERIA
D'AGRICULTURA,
PEIXCA I ALIMENTACIÓ

