

'SAEED-2'

1. Características vegetativas

Variedad muy vigorosa, de porte abierto y 3 brotes laterales por brote central.

El 83% de los brotes centrales y el 37% de los laterales son fructíferos. Variedad de producción media.

Hojas de tamaño medio con dientes de densidad intermedia. Forma del ápice agudo y sección transversal plana y curva.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (2 días antes que 'Algerie').

Panícula de forma intermedia, de floración baja (media de 130 flores/panícula), flores de color blanco y un cuajado del 9%.

3. Características del fruto

Maduración en la cuarta semana de abril (8 días antes que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice cóncavo. La piel es de color amarilla y la pulpa es blanca amarillenta.

Peso medio de 46,71 g, calibre medio de 39,11 mm y espesor de la pulpa de 8,12 mm. Pelado con ligera dificultad y de sabor mediocre. Escasa incidencia de mancha púrpura, nula tendencia al rajado y ligera sensibilidad al moteado en condiciones favorables.

Sólidos solubles: 12,53 °Brix.

Acidez: 7,25 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,40 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 1,66 g y una media de 4-5 semillas por fruto.

