

## 'PEIX'

### 1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, de porte abierto y 2 brotes laterales por brote central.

El 63% de los brotes centrales y el 30% de los laterales son fructíferos. Variedad medianamente productiva.

Hojas de tamaño medio con dientes de densidad intermedia. Forma del ápice agudo y sección transversal curva.

### 2. Floración

Plena floración en la segunda semana de noviembre (2 días después que 'Algerie').

Panícula de forma cónica, de floración media (media de 240 flores/panícula), flores de color blanco y un cuajado del 9,93%.

### 3. Características del fruto

Maduración en la primera semana de mayo (3 días después que 'Algerie').

Fruto redondeado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz abierta, y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 79,24 g, calibre medio de 50,37 mm y espesor de la pulpa de 10,85 mm. Pelado medio y de sabor bueno. Nula incidencia de mancha púrpura, ligera tendencia al rajado y muy sensible al moteado en condiciones favorables.

Sólidos solubles: 11,65 °Brix.

Acidez: 11,30 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,30 kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma elíptica, peso medio de 3,21 g y una media de 4-6 semillas por fruto.

