

## 'TONI TOMACA'

### 1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, de porte abierto y 3 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes tanto centrales como laterales son fructíferos. Variedad de producción baja.

Hojas de tamaño grande con dientes espaciados. Forma del ápice intermedia y sección transversal curva y ondulada.

### 2. Floración

Plena floración en la primera semana de octubre (33 días antes que 'Algerie').

Panícula de forma cónica, de floración baja (media de 150 flores/panícula), flores de color blanco y un cuajado del 12,08%.

### 3. Características del fruto

Maduración en la primera semana de abril (28 días antes que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta, y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 54,10 g, calibre medio de 43,56 mm y espesor de la pulpa de 10,05 mm. Pelado fácil y de sabor muy bueno. Ligera incidencia de mancha púrpura, ligera tendencia al rajado y nula sensibilidad al moteado en condiciones favorables.

Sólidos solubles: 14,30 °Brix.

Acidez: 15,45 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,65 kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma ovalada, peso medio de 2,66 g y una media de 3-5 semillas por fruto.

