

'FERRÁN-12'

1. Características vegetativas.

Variedad vigorosa de porte colgante y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 25 de marzo (+3 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica, de base aguda ancha, y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 17,67 cm y 8,16 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 2,19).

2. Floración.

Fecha media de plena floración el 5 de mayo (igual que 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 16,77 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. Características del fruto.

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PCA.

Fecha media de madurez comercial el 4 de octubre (-25 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 23 de noviembre (-42 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 126,43 g, calibre medio 61,99 mm, relación longitud / anchura 0,87.

Fruto oblongo ancho transversal, de sección transversal cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es retuso, con una débil e incluso ausente acanaladura del mismo, sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal ausente o muy superficial.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es grande y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 22,05 ºBrix Acidez: 2,47 g/l ác. málico

Firmeza: 3,49 kgf



