

'SURUGA'

1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma triangular, cuya fecha media de brotación es el 2 de abril (+10 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma redondeada, de base obtusa y redondeada con el ápice agudo. Su longitud y anchura media es de 13,54 cm y 10,39 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,30).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 3 de mayo (-2 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 12,77 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme regular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PCNA.

Fecha media de madurez comercial el 16 de noviembre (+17 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 18 de enero (+14 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 177,58 g, calibre medio 75,21 mm, relación longitud / anchura 0,71.

Fruto oval muy ancho, de sección transversal cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es redondeado, sin acanaladura del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 17,05 °Brix

Acidez: 0,65 g/l ác. málico

Firmeza: 6,53 kgf

