

'MIKATANI GOSHO'

1. *Características vegetativas.*

Variedad medianamente vigorosa de porte erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 27 de marzo (+5 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda obtusa con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 14,28 cm y 8,76 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,63).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 26 de abril (-9 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 13,84 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma rómbica y cruciforme regular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PVNA.

Fecha media de madurez comercial el 5 de octubre (-24 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 15 de enero (+11 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 142,04 g, calibre medio 70,64 mm, relación longitud / anchura 0,66.

Fruto achatado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es truncado con hoyuelo, moderado acanalado del mismo, y débil agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. Presenta ligero agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal medio.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 19,08 °Brix

Acidez: 1,07 g/l ác. málico

Firmeza: 4,25 kgf

